

Регистрационный номер: ЛП-№(004146)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Сигницеф® Плюс

Международное непатентованное наименование: Кеторолак + Левофлоксацин

Лекарственная форма: капли глазные

Фармакотерапевтическая группа: Средства, применяемые в офтальмологии; противовоспалительные средства в комбинации с противомикробными средствами; нестероидные противовоспалительные средства в комбинации с противомикробными средствами

Код АТХ: S01CC. Нестероидные противовоспалительные и противомикробные средства в комбинации.

Фармакологические свойства:

Кеторолак – НПВП, обладающий анальгезирующей и противовоспалительной активностью. Он ингибирует циклооксигеназу, необходимую для биосинтеза простагландинов, участвующих в реакции воспаления и возникновении болевого синдрома. После местного офтальмологического применения кеторолак снижает содержание простагландинов в водянистой влаге. Согласно результатам клинических исследований кеторолак не оказывает значимого влияния на внутриглазное давление.

Левофлоксацин - синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Левофлоксацин блокирует ДНК-гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, нарушает суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК, подавляет синтез ДНК, вызывает глубокие морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах микробных клеток. Левофлоксацин активен в отношении большинства штаммов микроорганизмов *in vitro* и *in vivo*.

Показания к применению

Препарат Сигницеф Плюс показан к применению у взрослых пациентов с 18 лет для профилактики и лечения инфекционных осложнений, боли и воспаления в послеоперационном периоде факоэмульсификации катаракты и рефракционных операций.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к кеторолаку, левофлоксацину, другим хинолонам или к любому из вспомогательных веществ;
- Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте (или другим салицилатам) и/или другим нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП);
- Приступы бронхиальной астмы в анамнезе в ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП;
- Беременность (III триместр).

Способ применения и дозы:

По 1 капле препарата в конъюнктивальный мешок 4 раза в день. Лечение начинают за 1 день до хирургического вмешательства и продолжают в течение 5 дней.

Форма выпуска:

Капли глазные в виде суспензии белого или почти белого цвета.

Состав на 1 мл: кеторолака трометамол 5 мг и левофлоксацин (в виде гемигидрата) 5 мг.

Условия хранения:

Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике.

Срок годности:

Невскрытый флакон 2 года. После вскрытия упаковки хранить при температуре не выше 25 °С не более 45 дней.

Условия отпуска из аптек: по рецепту

Необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению.