

ИНОКАИН® INOKAIN

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Регистрационный номер: П N012272/01

Торговое название: Инокаин®

Международное (непатентованное) название: оксибупрокаин

Химическое название: 2-(диэтиламино)этиловый эфир 4-амино-3-бутокси-бензойной кислоты моногидрохлорид

Лекарственная форма: капли глазные

Состав

1 мл препарата содержит:

Активное вещество:

беноксината гидрохлорид (оксибупрокаина гидрохлорид) 4 мг;

Вспомогательные вещества:

бензалкония хлорид 0,1 мг, борная кислота 19,0 мг, динатрия эдетат 0,1 мг, натрия хлорид 8,0 мг, вода для инъекций до 1 мл.

Описание

прозрачный бесцветный раствор.

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство.

Код АТХ: S01HA02

Фармакологическое действие

Местный анестетик; блокирует нервные окончания. Хорошо проникает в ткани при местном назначении. По сравнению с тетракаином и другими местными анестетиками оказывает меньшее раздражающее действие на конъюнктиву и роговицу.

Поверхностная анестезия конъюнктивы и роговицы наступает через 30 секунд и сохраняется 15 минут.

Фармакокинетика

Инокаин® легко проникает в строму роговицы после однократной инстилляцией его в конъюнктивальную полость. В течение последующих 15 минут наблюдается количественное снижение стромальной концентрации препарата, что обуславливает 12-15 минутный период анестезии при однократной инстилляцией.

Показания к применению

Местная анестезия в офтальмологии:

- измерение внутриглазного давления (тонометрия);
- гониоскопия;
- диагностический соскоб конъюнктивы;
- извлечение инородных тел и швов из роговицы и конъюнктивы;
- кратковременные хирургические вмешательства на роговице и конъюнктиве.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности, кормления грудью и у детей нет. Возможно применение Инокаина® для лечения детей, беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

Способ применения и дозы

Местно, закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле.

Длительную анестезию (до 1 часа) обеспечивает 3-кратное закапывание с интервалом в 4-5 минут.

Побочные эффекты

Кратковременное ощущение покалывания, жжение и гиперемия конъюнктивы; аллергические реакции; кератит (редко).

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие

В литературе не описаны отрицательные или положительные эффекты при одновременном введении в конъюнктивальную полость оксибупрокаина и других, традиционно применяемых глазных капель.

Отмечено, что оксибупрокаин теоретически может снижать антибактериальную активность сульфаниламидов.

Особые указания

Применять только для инстилляций в конъюнктивальный мешок. Не использовать для инъекций.

Продолжительное, многократное и длительное применение (как и других местных анестетиков), может привести к стабильному помутнению роговицы.

Не предназначен для длительной терапии в комплексном лечении заболеваний глаз.

Во время анестезии необходимо защитить глаз от раздражающих химических воздействий, инородных тел и трения.

Форма выпуска

Капли глазные 0,4%.

- По 5 мл в пластиковый флакон-капельницу с завинчивающимся колпачком. Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
- По 5 мл во флакон темного стекла, закрытый резиновой пробкой, обжатой алюминиевым колпачком с предохранительным пластмассовым колпачком. По одному стеклянному флакону со стерильной капельницей, упакованной в полиэтиленовый пакет, помещают в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 1 месяца.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Не замораживать. Хранить в местах, недоступных для детей.

Отпускается по рецепту.

Производитель

Сентисс Фарма Пвт. Лтд.

Виллидж Кхера Нихла,

Техсил Налагарх, р-н Солан,

Химачал Прадеш, 174101, Индия.

Адрес для направления претензий:

ООО «Сентисс Рус»

111033, Москва, Золоторожский вал, д.11, стр.21

тел.: (495) 229-76-63, факс: (495) 229-76-64